

レジメン名称：N20-101 Nivolumab q2w (MSI-High/結腸・直腸癌)

休薬期間：14日

| 分類 | No. | 薬剤/手技                                   | 投与量   | day(1) |
|----|-----|-----------------------------------------|-------|--------|
| 注射 | 1   | 静脈内注射（リザーバーより）                          |       | ●      |
|    |     | 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付                  | 1筒    |        |
|    |     | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)      | 1筒    |        |
|    |     | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)               |       |        |
| 注射 | 2   | 点滴注射                                    |       | ●      |
|    |     | 生食注（生理食塩液）100mL（PG）                     | 1瓶    |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>ライン確保およびフラッシュ用             |       |        |
| 注射 | 3   | 点滴注射                                    |       | ●      |
|    |     | オプジーボ注<br>(240mg/Body)                  | 240mg |        |
|    |     | 生理食塩液 PL 50mL                           | 50mL  |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>インラインフィルターを使用。<br>30分以上かけて |       |        |
| 注射 | 4   | 静脈内注射                                   |       | ●      |
|    |     | 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付                  | 1筒    |        |
|    |     | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)<br>フラッシュ用     |       |        |