

レジメン名称：G15-201 GEM（d1,8）/CBDCA（AUC=4-6） triweekly 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	
		デキサート注 3. 3mg / 1m l	6.6mg		
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴注射		●	
		ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg / m ²		
		5%ブドウ糖注 100m l	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	4	点滴注射		●	
		カルボプラチン (AUC=4-6)	0mg / A		
		5%ブドウ糖注 250m l	250mL		
		点滴注射：1日1回 60分で			
注射	5	点滴注射		●	
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射	6	静脈内注射		●	
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			
注射	7	点滴注射			●
		デキサート注 3. 3mg / 1m l	6.6mg		
		生食注(生理食塩液) 100m l (P G)	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	8	点滴注射			●
		ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg / m ²		
		5%ブドウ糖注 100m l	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	9	点滴注射			●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射	10	静脈内注射			●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			