

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射	2	持続点滴 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 持続点滴：1日1回 トレアキシン終了後、抜去可 メイン	250mL	●	
注射	3	点滴注射 ボララミン注 5mg/1mL 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 30分で	1A 50mL	●	
注射	4	点滴注射 ガザイバ注 （1000mg/body） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） （全量250mLに調製） インラインフィルター使用 点滴注射：1日1回 初回12.5mL/hで開始。30分毎に12.5mL/hずつ上げ 100mL/hまで。2回目以降30mL/hで開始。30 分毎に25mL/hずつ上げ100mL/hまで。2サイクル以降、 最初の30分は30mL/h。その後225mL/hで投与可。 初回4.5h。2回目以降3.5h。2サイクル以降2h。	1000mg 250mL	●	
注射	5	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1袋	●	
注射	6	点滴注射 トレアキシン注 （90mg/m ² ） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 10分で	90mg/m ² 50mL	●	
注射	7	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	
注射	8	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●	
注射	9	点滴注射 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 トレアキシン終了後、抜去可 メイン	250mL		●
注射	10	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100mL		●
注射	11	点滴注射 トレアキシン注 （90mg/m ² ） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 10分で	90mg/m ² 50mL		●
注射	12	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶		●
注射	13	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒		●