

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パリンロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	プロイメンド注 150mg	150mg	
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3 点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 15分で		
注射	4 点滴注射		●
	トラスツズマブBS注 (6mg/kg)	6mg/kg	
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回 2回目以降30分可。		
注射	5 点滴注射		●
	エルプラット注 (130mg/m <sup>2</sup> )	130mg/m <sup>2</sup>	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 120分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	7 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)		
内服			
	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> 分2 食後	day(1)~(14)服用