

分類 No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
注射 2 静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●
生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒						
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミン)	1筒						
ワンショット：1日1回							
不要の場合は削除可							
注射 3 点滴注射		●	●	●	●	●	●
デキサート注 3. 3mg/1ml	6A						
生食注（生理食塩液）100ml（PG）	100mL						
点滴注射：1日1回							
30分で							
注射 4 点滴注射		●	●	●	●	●	●
カイプロリス注 (56mg/m ²)	56mg/m ²						
★全量250mLに調製★							
注射用蒸留水 100ml（PG） (カイプロリス溶解用)	1瓶						
5%ブドウ糖注 250ml	250mL						
点滴注射：1日1回							
30分で							
注射 5 点滴注射		●	●	●	●	●	●
生理食塩液PL 50ml	1瓶						
点滴注射：1日1回							
フラッシュ用							
注射 6 皮下注射		●				●	
ダラキユーロ配合皮下注 (1800mg/body)	1800mg						
ワンショット：1日1回							
時計回りに腹部皮下組織に投与							
3～5分で							
(カイプロリス投与後)							
内服							
レナデックス	40mg/日 分1 食後						day(22)服用