

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射 2	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン 3時間で	500mL	●	
注射 3	点滴注射 水性ブドニオン注 アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	100mg 1袋	●	
注射 4	点滴注射 ジェムザール注 (875mg/m ²) 5%ブドウ糖注 100mL 点滴注射：1日1回 30分で	875mg/m ² 100mL	●	
注射 5	点滴注射 オンコビン注 (1.4mg/m ² 、最大2mg/B) 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 適宜。 全開。	1.4mg/m ² 50mL	●	
注射 6	点滴注射 エンドキサン注 (750mg/m ²) 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 90分で	750mg/m ² 250mL	●	
注射 7	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	
注射 8	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●	
注射 9	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100mL		●
注射 10	点滴注射 ジェムザール注 (875mg/m ²) 5%ブドウ糖注 100mL 点滴注射：1日1回 30分で	875mg/m ² 100mL		●
注射 11	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶		●
注射 12	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒		●
内服	プレドニゾン	100mg/日 分1食後		day(2)～(5)服用