

| 分類 | No. | 薬剤/手技                               | 投与量   | day(1) |
|----|-----|-------------------------------------|-------|--------|
| 注射 | 1   | 静脈内注射（リザーバーより）                      |       | ●      |
|    |     | 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付                | 1筒    |        |
|    |     | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック）  | 1筒    |        |
|    |     | ワンショット：1日1回<br>（不要の場合は削除）           |       |        |
| 注射 | 2   | 点滴注射                                |       | ●      |
|    |     | 生食注（生理食塩液）100mL（PG）                 | 1瓶    |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>ライン確保およびフラッシュ用         |       |        |
| 注射 | 3   | 点滴注射                                |       | ●      |
|    |     | キイトルーダ注<br>（200mg/body）             | 200mg |        |
|    |     | 生食注（生理食塩液）100mL（PG）                 | 100mL |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>インラインフィルターを使用。<br>30分で |       |        |
| 注射 | 4   | 静脈内注射                               |       | ●      |
|    |     | 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付                | 1筒    |        |
|    |     | ワンショット：1日1回<br>（不要の場合は削除）<br>フラッシュ用 |       |        |