

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ベリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL(ベリンNa) ワンショット：1日1回 リザーバーフラッシュ用 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射（リザーバーより） デキサート注 3.3mg / 1ml ポララミン注 5mg / 1ml アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL 点滴注射：1日1回 30分	6.6mg 1A 1袋	●
注射 3	点滴注射(リザーバーより) サイラムザ注 (8mg/kg) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 (全量250mLに調製) (インラインフィルターを使用) 初回60分で投与。忍容性が良好であれば、 2回目以降30分で投与。	8mg/kg 250mL	●
注射 4	点滴注射 生理食塩液 PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 5	点滴注射（リザーバーより） レボホリナート注 (200mg/m ²) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 120分	200mg/m ² 250mL	●
注射 6	点滴注射(リザーバーより) カンプト注 (150-180mg/m ²) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 90分	150mg/m ² 250mL	●
注射 7	点滴注射(リザーバーより) 5-FU注 (400mg/m ²) 生理食塩液 PL 50ml 点滴注射：1日1回 レボホリナート終了後全開 4分	400mg/m ² 50mL	●
注射 8	点滴注射 生理食塩液 PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 9	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒	●
注射 10	点滴注射(リザーバーより) 5-FU注 (2400mg/m ²) 生食注(生理食塩液) 100ml (PG) (全量140mlに調製) 点滴注射：1日1回 type_T (青色タイプで持ち帰り) 46時間	2400mg/m ² 1瓶	●