

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回		
	リザーバーフラッシュ用 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3. 3mg / 1m l	6.6mg	
	アロキシン注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回		
	30 分で		
注射 3	点滴注射(リザーバーより)		●
	ザルトラップ注 (4mg/kg)	4mg/kg	
	生食注（生理食塩液）100m l（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回		
	インラインフィルターを使用。 60 分で		
注射 4	点滴注射（リザーバーより）		●
	レボホリナート注 (200mg/m <sup>2</sup> )	200mg/m <sup>2</sup>	
	生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回 120分で		
注射 5	点滴注射(リザーバーより)		●
	カンプト注 (150mg/m <sup>2</sup> )	150mg/m <sup>2</sup>	
	生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 90 分で		
注射 6	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注 (400mg/m <sup>2</sup> )	400mg/m <sup>2</sup>	
	生理食塩液PL 50m l	50mL	
	点滴注射：1日1回 レボホリナート終了後全開 4 分で		
注射 7	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用。		
注射 8	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
注射 9	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注 (2400mg/m <sup>2</sup> )	2400mg/m <sup>2</sup>	
	生食注（生理食塩液）100m l（PG） (全量140m l に調製)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 type_T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で		