

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射 1	静脈内注射		●	●	●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(^\circ ミック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒				
注射 2	点滴注射		●	●	●	●
	デキサート注 3. 3mg／1mL ポララミン注 5mg／1mL ガスター注 20mg 生食注（生理食塩液）100mL (PG) 点滴注射：1日1回 エムプリシティ投与の3-24時間前にデカドロ ン錠の内服を確認。 30 分で	2A 1A 1A 100mL				
注射 3	点滴注射		●	●	●	●
	生食注（生理食塩液）100mL (PG) 点滴注射：1日1回 45 分以上かけて	100mL				
注射 4	点滴注射		●	●	●	●
	【要時】エムプリシティ注 (10mg/kg) 注射用蒸留水 100mL (PG) (エムプリシティ溶解用) 生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 2コース目以降、120mL/h。	10mg/kg 1瓶 250mL				
注射 5	点滴注射		●	●	●	●
	生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で	1瓶				
注射 6	静脈内注射		●	●	●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)	1筒				
内服						
	レナリドミド	25mg/日 分1 食後		day(1)～(21)服用		
内服						
	レナデックス	28mg/日 分1 食後		day(1)(8)(15)(22)服用		