

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 へパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（へパミロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL ポララミン注 5mg/1mL ガスター注 20mg 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1A 1A 100mL	●	●
注射 3	点滴注射 トラストズマブBS注 （初回のみ8mg/kg） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 初回：90分。	8mg/kg 250mL	●	
注射 4	点滴注射 パクリタキセル注 （80mg/m ² ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で	80mg/m ² 250mL	●	●
注射 5	点滴注射 ジェムザール注 （1200mg/m ² ） 5%ブドウ糖注 100mL 点滴注射：1日1回 30分で	1200mg/m ² 100mL	●	●
注射 6	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で	1瓶	●	●
注射 7	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒	●	●