

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	ソルデム3A注 500mL	500mL	
	★ 20mL メイロン84注	1A	
	点滴注射：1日1回 180分で メイン		
注射	3 点滴注射		●
	水溶性プレドニン注 (60mg/m ² ・Max100mg/B)	60mg/m ²	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	4 点滴注射		●
	アドリアシン注 (50mg/m ²)	50mg/m ²	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	5 点滴注射		●
	オンコビン注 (1.4mg/m ² 、最大2mg/B)	1.4mg/m ²	
	生理食塩液PL 50mL	50mL	
	点滴注射：1日1回 全開。		
注射	6 点滴注射		●
	エンドキサン注 (750mg/m ²)	750mg/m ²	
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回 90分で		
注射	7 点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	8 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
内服			
	プレドニゾロン	100mg/日 分1-2 食後	day(2)～(5)服用