

| 分類 No. | 薬剤/手技                              | 投与量                          | day(1)        |
|--------|------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 注射 1   | 静脈内注射                              |                              | ●             |
|        | 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付             | 1筒                           |               |
|        | パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パリンロック) | 1筒                           |               |
|        | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)          |                              |               |
| 注射 2   | 点滴注射                               |                              | ●             |
|        | プロイメンド注 150mg                      | 150mg                        |               |
|        | 生食注(生理食塩液) 100mL (PG)              | 100mL                        |               |
|        | 点滴注射：1日1回<br>30分で                  |                              |               |
| 注射 3   | 点滴注射                               |                              | ●             |
|        | デキサート注 3.3mg/1mL                   | 6.6mg                        |               |
|        | アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL               | 1袋                           |               |
|        | 点滴注射：1日1回<br>15分で                  |                              |               |
| 注射 4   | 点滴注射                               |                              | ●             |
|        | ハーセプチン注<br>(6mg/kg)                | 6mg/kg                       |               |
|        | 生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)              | 250mL                        |               |
|        | 点滴注射：1日1回<br>2回目以降30分可。            |                              |               |
| 注射 5   | 点滴注射                               |                              | ●             |
|        | エルプラット注<br>(130mg/m <sup>2</sup> ) | 130mg/m <sup>2</sup>         |               |
|        | 5%ブドウ糖注 250mL                      | 250mL                        |               |
|        | 点滴注射：1日1回<br>120分で                 |                              |               |
| 注射 6   | 点滴注射                               |                              | ●             |
|        | 生理食塩液 PL 50mL                      | 1瓶                           |               |
|        | 点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用                |                              |               |
| 注射 7   | 静脈内注射                              |                              | ●             |
|        | 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付             | 1筒                           |               |
|        | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)          |                              |               |
|        | フラッシュ用                             |                              |               |
| 内服     |                                    |                              |               |
|        | S-1                                | 80mg/m <sup>2</sup><br>分2 食後 | day(1)~(14)服用 |