

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●				●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒					
	ペナリクNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ペナミック)	1筒					
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用						
注射 2	点滴注射		●				
	ソルデム3A注 500mL	500mL					
	点滴注射：1日1回 メイン① 2時間で						
注射 3	点滴注射		●				
	ヴィーン3G注 500mL	500mL					
	点滴注射：1日1回 メイン② 90分で						
注射 4	点滴注射		●				
	ヴィーン3G注 500mL	500mL					
	点滴注射：1日1回 メイン③ 60分で						
注射 5	点滴側管注		●				
	生理食塩液PL 50mL	1瓶					
	点滴注射：1日1回 ケモセフルート確保用						
注射 6	点滴側管注		●				
	プロイメンド注 150mg	150mg					
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL					
	点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に(側注①) 30分で						
注射 7	点滴側管注		●				
	デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg					
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋					
	点滴注射：1日1回 Day1(側注②) 15分で						
注射 8	点滴側管注		●				
	ドセタキセル注 (70mg/m ²)	70mg/m ²					
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL					
	点滴注射：1日1回 (側注③) 60分で						
注射 9	点滴側管注		●				
	マンニトールS注 300mL/袋	300mL					
	点滴注射：1日1回 (側注④) 30分で						
注射 10	点滴側管注		●				
	シスプラチン注 (70mg/m ²)	70mg/m ²					
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL					
	点滴注射：1日1回 (側注⑤) ソルデム1本終了後 60分で						
注射 11	点滴側管注		●				
	生理食塩液PL 50mL	1瓶					
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用						
注射 12	点滴側管注		●				
	5-FU注 (2500-3500mg/m ²)	3500mg/m ²					
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	2瓶					
	(全量235mLに調製) 点滴注射：1日1回 LV2(黄色タイプ)使用。(側注⑥) 120時間で						
注射 13	静脈内注射		●				
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒					
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用						
注射 14	点滴注射			●	●	●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg					
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL					
	点滴注射：1日1回 Day2-5 30分で						