

| 分類 | No. 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) | day(15) |
|----|--|----------------|--------|--------------|
| 注射 | 1 静脈内注射 | | ● | ● |
| | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 | 1筒 | | |
| | パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パリンロック) | 1筒 | | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | | | |
| 注射 | 2 点滴注射 | | ● | ● |
| | デキサート注 3.3mg/1ml | 10A | | |
| | ポララミン注 5mg/1ml | 1A | | |
| | ガスター注 20mg | 1A | | |
| | 生食注(生理食塩液) 100ml (PG) | 100mL | | |
| | 点滴注射：1日1回 30分で | | | |
| 注射 | 3 点滴注射 | | ● | ● |
| | 生食注(生理食塩液) 100ml (PG) | 100mL | | |
| | 点滴注射：1日1回 30分以上かけて | | | |
| 注射 | 4 点滴注射 | | ● | ● |
| | サークリサ注 (20mg/kg) | 20mg/kg | | |
| | 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 【全量250mLに調製】 | 250mL | | |
| | 点滴注射：1日1回 初回：最初60分；20mL/h。 次30分；25mL/h、次30分；30mL/h、 次30分；40mL/h、次30分；45mL/h、 以降；50ml/hまで。 2回目以降、最初60分；20mL/h 次30分；30mL/h、次30分；45mL/h、 以降；50ml/hまで インラインフィルター使用 | | | |
| 注射 | 5 点滴注射 | | ● | ● |
| | 生理食塩液 PL 50ml | 1瓶 | | |
| | 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 | | | |
| 注射 | 6 静脈内注射 | | ● | ● |
| | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 | 1筒 | | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 | | | |
| 内服 | | | | |
| | レナデックス | 40mg/日 分1食後 | | day(8)(22)服用 |