

レジメン名称：G15-301 GCOP（750）（外来）

休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック）	1筒		
		ワンショット：1日1回			
		（不要の場合は削除）			
注射	2	点滴注射		●	
		ソルデム3A注 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回			
		メイン			
		3時間で			
注射	3	点滴注射		●	
		水溶性プレドニン注	100mg		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回			
		30分で			
注射	4	点滴注射		●	
		ジェムザール注	750mg/m ²		
		（750mg/m ² ）			
		5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
		点滴注射：1日1回			
		30分で			
注射	5	点滴注射		●	
		オンコビン注	1.4mg/m ²		
		（1.4mg/m ² 、最大2mg/B）			
		生理食塩液PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回			
		適宜。			
		全開。			
注射	6	点滴注射		●	
		エンドキサン注	750mg/m ²		
		（750mg/m ² ）			
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL		
		点滴注射：1日1回			
		90分で			
注射	7	点滴注射		●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回			
		フラッシュ用			
注射	8	静脈内注射		●	
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回			
		（不要の場合は削除）			
		フラッシュ用			
注射	9	点滴注射			●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
		点滴注射：1日1回			
		30分で			
注射	10	点滴注射			●
		ジェムザール注	750mg/m ²		
		（750mg/m ² ）			
		5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
		点滴注射：1日1回			
		30分で			
注射	11	点滴注射			●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回			
		フラッシュ用			
注射	12	静脈内注射			●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回			
		（不要の場合は削除）			
		フラッシュ用			
内服					
		プレドニゾン	100mg/日 分1食後		day(2)～(5)服用