

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100m l（P G）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用		
注射	3 点滴注射		●
	キイトルーダ注 (200mg/Body)	200m g	
	生食注（生理食塩液）100m l（P G）	100m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30 分で		
注射	4 点滴注射		●
	デキサート注 3.3m g / 1m l	6.6m g	
	生食注（生理食塩液）100m l（P G）	100m L	
	点滴注射：1日1回 15 分で		
注射	5 点滴注射		●
	アリムタ注射用 (500m g /m ²)	500m g /m ²	
	生食注（生理食塩液）100m l（P G）	100m L	
	点滴注射：1日1回 10 分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	7 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		