

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パリンロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	デキサート注 3.3 mg / 1 mL	9.9 mg	
	アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射 3	点滴注射		●
	塩酸エピルビシン注 (100mg/m ²)	100mg / m ²	
	生理食塩液 P L 50 mL	50 mL	
	点滴注射：1日1回 (全開投与) 5 分で		
注射 4	点滴注射		●
	エンドキサン注 (600mg/m ²)	600mg / m ²	
	生食注（生理食塩液）100 mL (P G)	100 mL	
	点滴注射：1日1回 15 分で		
注射 5	点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 mL	50 mL	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で		
注射 6	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		