

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ペリNaBが用100単位/mLシリンジ 10mL（ ¹ ℃-5℃） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●		●
注射	2	点滴注射 ボララミン注 5mg／1m l ガスター注 20mg デキサート注 3、3mg／1m l アロキシ注バッグ 0.75mg／50mL 点滴注射：1日1回 30分で	1A 1A 16.5mg 1袋	10:30		
注射	3	点滴注射 イホマイド注 （1.6g/m2） 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 2時間で	1.6g/ml 500mL	11:00		
注射	4	点滴注射 バクリタキセル注 （135mg/m2） 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 180分で	135mg/ml 500mL	14:00		
注射	5	点滴注射 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●		
注射	6	点滴注射 ウロミチキサン注 400mg／4m l （320mg/m2） 生食注（生理食塩液）100m l（P G） 点滴注射：1日1回 30分で	320mg/ml 100mL	11:00		
注射	7	点滴注射 ウロミチキサン注 400mg／4m l （320mg/m2） 生食注（生理食塩液）100m l（P G） 点滴注射：1日1回 30分で	320mg/ml 100mL	15:00		
注射	8	点滴注射 ウロミチキサン注 400mg／4m l （320mg/m2） 生食注（生理食塩液）100m l（P G） 点滴注射：1日1回 30分で	320mg/ml 100mL	19:00		
注射	9	持続点滴 ソルデム3A注 500m l ★ 20m l メイロン84注 持続点滴：1日1回 6時間で	500mL 1A	10:00		
注射	10	持続点滴 ソルデム3A注 500m l ★ 20m l メイロン84注 持続点滴：1日1回 6時間で	500mL 1A	16:00		
注射	11	持続点滴 ソルデム3A注 500m l ★ 20m l メイロン84注 持続点滴：1日1回 6時間で	500mL 1A	22:00		
注射	12	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●		
注射	13	点滴注射 デキサート注 3、3mg／1m l 生食注（生理食塩液）100m l（P G） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100mL	10:30	10:30	
注射	14	点滴注射 イホマイド注 （1.6g/m2） 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 2時間で	1.6g/ml 500mL	11:00	11:00	
注射	15	点滴注射 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	●	
注射	16	点滴注射 ウロミチキサン注 400mg／4m l （320mg/m2） 生食注（生理食塩液）100m l（P G） 点滴注射：1日1回 30分で	320mg/ml 100mL	11:00	11:00	
注射	17	点滴注射 ウロミチキサン注 400mg／4m l （320mg/m2） 生食注（生理食塩液）100m l（P G） 点滴注射：1日1回 30分で	320mg/ml 100mL	15:00	15:00	
注射	18	点滴注射 ウロミチキサン注 400mg／4m l （320mg/m2） 生食注（生理食塩液）100m l（P G） 点滴注射：1日1回 30分で	320mg/ml 100mL	19:00	19:00	
注射	19	持続点滴 ソルデム3A注 500m l ★ 20m l メイロン84注 持続点滴：1日1回 6時間で	500mL 1A	4:00	4:00	
注射	20	持続点滴 ソルデム3A注 500m l ★ 20m l メイロン84注 持続点滴：1日1回 6時間で	500mL 1A	10:00	10:00	
注射	21	持続点滴 ソルデム3A注 500m l ★ 20m l メイロン84注 持続点滴：1日1回 6時間で	500mL 1A	16:00	16:00	
注射	22	持続点滴 ソルデム3A注 500m l ★ 20m l メイロン84注 持続点滴：1日1回 6時間で	500mL 1A	22:00	22:00	
注射	23	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●	●	