

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
注射 2	点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ルート確保及びフラッシュ用(キイトルーダ)		
注射 3	点滴注射		●
	キイトルーダ注 (200mg/body)	200mg	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で		
注射 4	点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 5	点滴側管注		●
	カルボプラチン (AUC=5)	0mg/A	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 6	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 7	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
注射 8	点滴注射		●
	5-FU注 (4000mg/m ²)	4000mg/m ²	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 LV2で全量185mLに調製。 96時間で		