

レジメン名称：A15-101 ADM triweekly 休薬期間：21日

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック) ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 プロイメンド注 150mg 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	150mg 100mL	●
注射 3	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 15分で	9.9mg 1袋	●
注射 4	点滴注射 アドリアシン注 （75mg/m <sup>2</sup> ） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	75mg/m <sup>2</sup> 100mL	●
注射 5	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 6	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●