

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射 1	点滴注射		●	●	●	●	●
	ソルデム3A注 500ml	500mL					
	点滴注射：1日1回						
	120分で						
注射 2	点滴注射		●				
	プロイメンド注 150mg	150mg					
	生食注（生理食塩液）100ml（PG）	100mL					
	点滴注射：1日1回						
	30分で						
注射 3	点滴注射		●				
	デキサート注 3.3mg/1ml	9.9mg					
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋					
	点滴注射：1日1回						
	15分で						
注射 4	点滴注射		●				
	エトボシド注	60mg/m <sup>2</sup>					
	(60mg/m <sup>2</sup> )						
	5%ブドウ糖注 250ml	250mL					
	点滴注射：1日1回						
	60分で						
注射 5	点滴注射		●				
	ウロミテキサン注 400mg/4ml	270mg/m <sup>2</sup>					
	(270mg/m <sup>2</sup> )						
	生食注（生理食塩液）100ml（PG）	100mL					
	点滴注射：1日1回						
	30分で						

注射	6 点滴注射		●
	イホマイド注	0.9 g / m <sup>2</sup>	
	(0.9g/m <sup>2</sup> )		
	生理食塩液注【生食】 5 0 0 m l	500m L	
	点滴注射：1 日 1 回		
	90 分で		
注射	7 点滴注射		●
	マンニトールS注 3 0 0 m L / 袋	300m L	
	点滴注射：1 日 1 回		
	6 0 分で		
注射	8 点滴注射		●
	シスプラチン注	20m g / m <sup>2</sup>	
	(20mg / m <sup>2</sup> )		
	生理食塩液注 2 5 0 m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1 日 1 回		
	6 0 分で		
注射	9 点滴注射		●
	ヴィーン3 G注 5 0 0 m L	500m L	
	点滴注射：1 日 1 回		
	6 0 分で		
注射	10 点滴注射		●
	ウロミテキサン注 4 0 0 m g / 4 m l	270m g / m <sup>2</sup>	
	(270mg/m <sup>2</sup> )		
	生食注 (生理食塩液) 1 0 0 m l (P G)	100m L	
	点滴注射：1 日 1 回		
	3 0 分で		
注射	11 点滴注射		●
	ヴィーン3 G注 5 0 0 m L	500m L	
	点滴注射：1 日 1 回		
	3 時間で		

注射 12	点滴注射	●				
	ヴィーン3G注 500mL		500mL			
	点滴注射：1日1回					
	(翌朝まで)					
注射 13	点滴注射	●				
	生理食塩液PL 50ml		1瓶			
	フラッシュ用					
	点滴注射：1日1回					
注射 14	静脈内注射	●				
	生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付		1筒			
	ワンショット：1日1回					
	フラッシュ用					
	(不要の場合は削除)					
注射 15	点滴注射	●	●	●	●	
	デキサート注 3.3mg/1ml		6.6mg			
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)		100mL			
	点滴注射：1日1回					
	30分					
注射 16	点滴注射	●	●	●	●	
	エトポシド注		60mg/m <sup>2</sup>			
	(60mg/m <sup>2</sup> )					
	5%ブドウ糖注 250ml		250mL			
	点滴注射：1日1回					
	60分					
注射 17	点滴注射	●				
	ウロミテキサン注 400mg/4ml		270mg/m <sup>2</sup>			
	(270mg/m <sup>2</sup> )					
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)		100mL			
	点滴注射：1日1回					
	30分					

注射	18	点滴注射			●
		イホマイド注		0.9 g / m <sup>2</sup>	
		(0.9g/m <sup>2</sup> )			
		生理食塩液注【生食】	500 ml	500m L	
		点滴注射：1日1回			
		90 分で			
注射	19	点滴注射			●
		マンニトールS注	300 mL/袋	300m L	
		点滴注射：1日1回			
		60 分で			
注射	20	点滴注射			●
		シスプラチン注		20m g / m <sup>2</sup>	
		(20mg / m <sup>2</sup> )			
		生理食塩液注	250 ml (ソフトバッグ)	250m L	
		点滴注射：1日1回			
		60 分で			
注射	21	点滴注射			●
		ヴィーン3G注	500 mL	500m L	
		点滴注射：1日1回			
		60 分で			
注射	22	点滴注射			● ●
		ウロミテキサン注	400 mg / 4 ml	270m g / m <sup>2</sup>	
		(270mg/m <sup>2</sup> )			
		生食注 (生理食塩液)	100 ml (PG)	100m L	
		点滴注射：1日1回			
		30 分で			
注射	23	点滴注射			●
		ヴィーン3G注	500 mL	500m L	
		点滴注射：1日1回			
		3 時間で			

注射	24	点滴注射		●
		ヴィーン3G注	500 mL	
		点滴注射：1日1回		
		(翌朝まで)		
注射	25	点滴注射		●
		生理食塩液PL	50 mL	1瓶
		フラッシュ用		
		点滴注射：1日1回		
注射	26	静脈内注射		●
		生食注シリンジ	20 mL	【要時】 ロック付
		ワンショット：1日1回		1筒
		フラッシュ用		
		(不要の場合は削除)		
注射	27	点滴注射		●
		イホマイド注		0.9 g/m <sup>2</sup>
		(0.9g/m <sup>2</sup> )		
		生理食塩液注【生食】	500 mL	500m L
		点滴注射：1日1回		
		90 分で		
注射	28	点滴注射		●
		マンニトールS注	300 mL/袋	300m L
		点滴注射：1日1回		
		60 分で		
注射	29	点滴注射		●
		シスプラチン注		20m g/m <sup>2</sup>
		(20mg/m <sup>2</sup> )		
		生理食塩液注	250 mL (ソフトバッグ)	250m L
		点滴注射：1日1回		
		60 分で		

注射	30	点滴注射		●
		ヴィーン3G注	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		60分		
注射	31	点滴注射		● ●
		ウロミテキサン注	270mg/m <sup>2</sup>	
		(270mg/m <sup>2</sup> )		
		生食注(生理食塩液)	100mL	
		点滴注射：1日1回		
		30分		
注射	32	点滴注射		●
		ヴィーン3G注	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		3時間		
注射	33	点滴注射		●
		ヴィーン3G注	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		(翌朝まで)		
注射	34	点滴注射		●
		生理食塩液PL	1瓶	
		フラッシュ用		
		点滴注射：1日1回		
注射	35	静脈内注射		●
		生食注シリンジ	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		フラッシュ用		
		(不要の場合は削除)		

注射	36	点滴注射			●
		イホマイド注		0.9 g / m <sup>2</sup>	
		(0.9g/m <sup>2</sup> )			
		生理食塩液注【生食】	500 ml	500m L	
		点滴注射：1日1回			
		90 分で			
注射	37	点滴注射			●
		マンニトールS注	300 mL / 袋	300m L	
		点滴注射：1日1回			
		60 分で			
注射	38	点滴注射			●
		シスプラチン注		20m g / m <sup>2</sup>	
		(20mg / m <sup>2</sup> )			
		生理食塩液注	250 ml (ソフトバッグ)	250m L	
		点滴注射：1日1回			
		60 分で			
注射	39	点滴注射			●
		ヴィーン3G注	500 mL	500m L	
		点滴注射：1日1回			
		60 分で			
注射	40	点滴注射			● ●
		ウロミテキサン注	400 mg / 4 ml	270m g / m <sup>2</sup>	
		(270mg/m <sup>2</sup> )			
		生食注 (生理食塩液)	100 ml (PG)	100m L	
		点滴注射：1日1回			
		30 分で			
注射	41	点滴注射			●
		ヴィーン3G注	500 mL	500m L	
		点滴注射：1日1回			
		3 時間で			

注射	42	点滴注射			●
		ヴィーン3G注	500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回			
		(翌朝まで)			
注射	43	点滴注射			●
		生理食塩液PL	50ml	1瓶	
		フラッシュ用			
		点滴注射：1日1回			
注射	44	静脈内注射			●
		生食注シリンジ	20ml	1筒	
		【要時】ロック付			
		ワンショット：1日1回			
		フラッシュ用			
		(不要の場合は削除)			
注射	45	点滴注射			●
		イホマイド注		0.9g/m <sup>2</sup>	
		(0.9g/m <sup>2</sup> )			
		生理食塩液注【生食】	500ml	500mL	
		点滴注射：1日1回			
		90分で			
注射	46	点滴注射			●
		マンニトールS注	300mL/袋	300mL	
		点滴注射：1日1回			
		60分で			
注射	47	点滴注射			●
		シスプラチン注		20g/m <sup>2</sup>	
		(20g/m <sup>2</sup> )			
		生理食塩液注	250ml (ソフトバッグ)	250mL	
		点滴注射：1日1回			
		60分で			

注射	48	点滴注射			●
		ヴィーン3G注	500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回			
		60分			
注射	49	点滴注射			●
		ウロミテキサン注	400mg/4mL	270mg/m <sup>2</sup>	
		(270mg/m <sup>2</sup> )			
		生食注(生理食塩液)100mL(PG)		100mL	
		点滴注射：1日1回			
		30分			
注射	50	点滴注射			●
		ヴィーン3G注	500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回			
		3時間			
注射	51	点滴注射			●
		ヴィーン3G注	500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回			
		(翌朝まで)			
注射	52	点滴注射			●
		生理食塩液PL	50mL	1瓶	
		フラッシュ用			
		点滴注射：1日1回			
注射	53	静脈内注射			●
		生食注シリンジ	20mL【要時】ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回			
		フラッシュ用			
		(不要の場合は削除)			