

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） ヘパリンNaが用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリック） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 ソルラクト注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン① 2時間で	500mL	●
注射 3	点滴注射 ソルラクト注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン② 2時間で	500mL	●
注射 4	点滴注射 ソルラクト注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン③ 5時間で	500mL	●
注射 5	点滴注射 ソルラクト注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン④ 5時間で	500mL	●
注射 6	点滴注射 ソルラクト注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン⑤ 5時間で	500mL	●
注射 7	点滴注射 ソルラクト注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン⑥ 5時間で	500mL	●
注射 8	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 側管1-① 30分で	6.6mg 1袋	●
注射 9	点滴注射 アドリアシン注 (50mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 側管1-② 30分で	50mg/m <sup>2</sup> 50mL	●
注射 10	点滴注射 マンニトールS注 300mL/袋 点滴注射：1日1回 側管1-③ 60分で	300mL	●
注射 11	点滴側管注 イホマイド注 (2.5g/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液注【生食】 500mL 点滴注射：1日1回 側管1-④ 側管②よりウロミテキサンも開始 12時間で	2.5g/m <sup>2</sup> 500mL	●
注射 12	点滴側管注 イホマイド注 (2.5g/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液注【生食】 500mL 点滴注射：1日1回 側管1-⑤ 12時間で	2.5g/m <sup>2</sup> 500mL	●
注射 13	点滴注射 ウロミテキサン注 400mg/4mL (1500mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液注【生食】 500mL 点滴注射：1日1回 側管2-① イホマイド開始と同時に 12時間で	1500mg/m <sup>2</sup> 500mL	●
注射 14	点滴注射 ウロミテキサン注 400mg/4mL (1500mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液注【生食】 500mL 点滴注射：1日1回 側管2-② 12時間で	1500mg/m <sup>2</sup> 500mL	●
注射 15	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 側管1-⑥ フラッシュ用	1瓶	●
注射 16	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●