

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射 1	点滴注射		●		
	デキサート注 3. 3 mg / 1 ml	6.6 mg			
	アロキン注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 2	点滴注射		●		
	カルボプラチン (450mg/m <sup>2</sup> )	450 mg / m <sup>2</sup>			
	5%ブドウ糖注 250 ml	250 mL			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射 3	点滴注射		●		
	エトポシド注 (150mg/m <sup>2</sup> )	150 mg / m <sup>2</sup>			
	5%ブドウ糖注 500 ml	500 mL			
	点滴注射：1日1回 120分で				
注射 4	点滴注射		●		
	ソルデム3A注 500 ml	500 mL			
	点滴注射：1日1回 120分で				
注射 5	点滴注射		●		
	ソルデム3A注 500 ml	500 mL			
	点滴注射：1日1回 (翌朝まで)				
注射 6	静脈内注射		●		
	生食注シリンジ 20 ml 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒			
注射 7	点滴注射			●	●
	デキサート注 3. 3 mg / 1 ml	6.6 mg			
	生食注 (生理食塩液) 100 ml (PG)	100 mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 8	点滴注射			●	●
	エトポシド注 (150mg/m <sup>2</sup> )	150 mg / m <sup>2</sup>			
	5%ブドウ糖注 500 ml	500 mL			
	点滴注射：1日1回 120分で				
注射 9	点滴注射			●	●
	ソルデム3A注 500 ml	500 mL			
	点滴注射：1日1回 120分で				
注射 10	点滴注射			●	●
	ソルデム3A注 500 ml	500 mL			
	点滴注射：1日1回 (翌朝まで)				
注射 11	静脈内注射			●	●
	生食注シリンジ 20 ml 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒			