

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒		
		ﾊﾞﾙﾝNaｸｸ用100単位/mLシリンジ 10mL(ﾊﾞﾙﾝｸｸ)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴側管注		●	
		デキサート注 3.3mg/1ml (10A/body)	10A		
		ボラミン注 5mg/1ml	1A		
		生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴側管注		●	
		リッキシマブBS注 (375mg/m <sup>2</sup> )	375mg/m <sup>2</sup>		
		生理食塩液注【生食】 500ml (1mg/mLになるように調製)	500mL		
		生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) (リッキシマブの希釈に使用)	1袋		
		点滴注射：1日1回 初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ 400mL/hまで。2回目以降100mL/hで開始。30 分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。 3~4h。2回目以降2-3h。			
注射	4	点滴側管注		●	
		アロキシン注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 15分で			
注射	5	点滴側管注		●	
		ジェムザール注 (1000mg/m <sup>2</sup> )	1000mg/m <sup>2</sup>		
		5%ブドウ糖注 100ml	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	6	点滴側管注		●	
		カルボプラチン (AUC=5)	0mg/A		
		5%ブドウ糖注 250ml	250mL		
		点滴注射：1日1回 60分で			
注射	7	点滴側管注		●	
		生理食塩液PL 50ml	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	8	静脈内注射		●	
		生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
		フラッシュ用			
注射	9	点滴注射		●	
		ソルデム3A注 500ml	500mL		
		★ 20ml メイロン84注	1A		
		点滴注射：1日1回 4~5時間で			
注射	10	点滴注射			●
		デキサート注 3.3mg/1ml	6.6mg		
		生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	11	点滴注射			●
		ジェムザール注 (1000mg/m <sup>2</sup> )	1000mg/m <sup>2</sup>		
		5%ブドウ糖注 100ml	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	12	点滴注射			●
		生理食塩液PL 50ml	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	13	静脈内注射			●
		生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
		フラッシュ用			
内服		デキサメタゾン	40mg/日 分1食後		day(2)~(4)服用