

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)
注射 2	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック) ワンショット：1日1回 不要の場合は削除可	1筒 1筒	●	●	●	●	●	●	
注射 3	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL (PG) 点滴注射：1日1回 30 分で	6A 100mL	●	●	●	●	●	●	
注射 4	点滴注射 カイプロリス注 (20mg/m <sup>2</sup> 、最大44mg/B) 注射用蒸留水 100mL (PG) (カイプロリス溶解用) 5%ブドウ糖注 100mL 点滴注射：1日1回 30 分で	20mg/m <sup>2</sup> 1瓶 100mL	●	●					
注射 5	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	●					
注射 6	皮下注射 ダラキュー配合皮下注 (1800mg/body) ワンショット：1日1回 時計回りに腹部皮下組織に投与 3~5分で (カイプロリス投与後)	1800mg	●						
注射 7	点滴注射 カイプロリス注 (56mg/m <sup>2</sup> ) ★全量250mLに調製★ 注射用蒸留水 100mL (PG) (カイプロリス溶解用) 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 30 分で	56mg/m <sup>2</sup> 1瓶 250mL	●	●	●	●	●		
注射 8	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	●	●	●	●		
注射 9	皮下注射 ダラキュー配合皮下注 (1800mg/body) ワンショット：1日1回 時計回りに腹部皮下組織に投与 3~5分で (カイプロリス投与後)	1800mg	●	●					
注射 10	皮下注射 ダラキュー配合皮下注 (1800mg/body) ワンショット：1日1回 時計回りに腹部皮下組織に投与 3~5分で	1800mg	●						
内服	レナデックス	40mg/日 分1 食後			day(22)服用				