レジメン名称：I22-301 IsaKd療法 monthly ｻｲｸﾙ1（BW86-100）　　休薬期間：28日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●	●
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒							
		ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ 10mL(ﾍﾟﾐﾛｯｸ)	1筒							
		ワンショット：１日１回								
注射	2	点滴注射		●		●		●		●
		デキサート注　３．３ｍｇ／１ｍｌ	5Ａ							
		ポララミン注　５ｍｇ／１ｍｌ	1Ａ							
		ガスター注　２０ｍｇ/２ｍＬ	1Ａ							
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	100ｍＬ							
		点滴注射：１日１回								
		30　分で								
注射	3	点滴注射		●		●		●		●
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	1瓶							
		点滴注射：１日１回								
		30　分以上かけて								
注射	4	点滴注射		●		●		●		●
		サークリサ注	10ｍｇ/kg							
		（10mg/kg）								
		生理食塩液注　２５０ｍｌ（ソフトバッグ）	250ｍＬ							
		【全量250mLに調製】								
		点滴注射：１日１回								
		初回：最初60分；40mL/h。								
		以降、30分毎に10mL/hずつ上げ90mL/hまで。								
		2回目以降：最初60分；40mL/h。								
		次30分；60mL/h、次30分；90mL/h、以降100ml/hまで。								
		インラインフィルターを使用。								
注射	5	点滴注射		●		●		●		●
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶							
		点滴注射：１日１回								
		サークリサフラッシュ用								
注射	6	点滴注射		●						
		カイプロリス注	20ｍｇ/㎡							
		（20mg/㎡）								
		注射用蒸留水　１００ｍｌ（ＰＧ）	1瓶							
		（カイプロリス溶解用）								
		５％ブドウ糖注　１００ｍｌ	100ｍＬ							
		点滴注射：１日１回								
		30分で								
注射	7	点滴注射		●						
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶							
		点滴注射：１日１回								
		カイプロリスフラッシュ用								
注射	8	点滴注射			●		●		●	
		デキサート注　３．３ｍｇ／１ｍｌ	5Ａ							
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	100ｍＬ							
		点滴注射：１日１回								
		30　分で								
注射	9	点滴注射			●					
		カイプロリス注	20ｍｇ/㎡							
		（20mg/㎡）								
		注射用蒸留水　１００ｍｌ（ＰＧ）	1瓶							
		（カイプロリス溶解用）								
		５％ブドウ糖注　１００ｍｌ	100ｍＬ							
		点滴注射：１日１回								
		30分で								
注射	10	点滴注射			●	●				
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶							
		点滴注射：１日１回								
		カイプロリスフラッシュ用								
注射	11	点滴注射				●	●	●	●	
		カイプロリス注	56ｍｇ/㎡							
		（56mg/㎡）								
		注射用蒸留水　１００ｍｌ（ＰＧ）	1瓶							
		（カイプロリス溶解用）								
		５％ブドウ糖注　１００ｍｌ	100ｍＬ							
		点滴注射：１日１回								
		30分で								
注射	12	点滴注射					●	●	●	
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶							
		点滴注射：１日１回								
		カイプロリスフラッシュ用								
内服										
		レナデックス	20mg/日		day(23)服用					
			分1 食後							