

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミン) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●	●	●	●	●
注射 2	点滴注射 アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL 点滴注射：1日1回 30分で	1袋	●				
注射 3	点滴注射 【要時】 テモダール注 (150mg/m <sup>2</sup> ) 注射用蒸留水 100m l (PG) (1Vあたり41mLで溶解) 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 90分で	150mg / m <sup>2</sup> 2瓶 250mL	●				
注射 4	点滴注射 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●				
注射 5	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)	1筒	●				
注射 6	点滴注射 生食注(生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 ルート確保およびフラッシュ用	1瓶		●	●	●	●
注射 7	点滴注射 【要時】 テモダール注 (150mg/m <sup>2</sup> ) 注射用蒸留水 100m l (PG) (1Vあたり41mLで溶解) 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 90分で	150mg / m <sup>2</sup> 2瓶 250mL		●	●	●	●
注射 8	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)	1筒		●	●	●	●