レジメン名称：P16-202 dose-dense TC　　休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒			
		ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ 10mL「NIG」(ﾍﾞﾐﾛｯｸ)	1筒			
		ワンショット：１日１回				
		（不要の場合は削除）				
注射	2	点滴注射		●		
		デキサート注　３．３ｍｇ／１ｍｌ	6.6ｍｇ			
		ポララミン注　５ｍｇ／１ｍｌ	1Ａ			
		ガスター注　２０ｍｇ	1Ａ			
		アロキシ注バッグ　０.７５ｍｇ／５０ｍL	1袋			
		30　分で				
		点滴注射：１日１回				
注射	3	点滴注射		●		
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	50ｍＬ			
		30分で(PTX投与前の時間確保用)				
		点滴注射：１日１回				
注射	4	点滴注射		●		
		パクリタキセル注	80ｍｇ/㎡			
		(80mg/㎡)				
		生理食塩液注　２５０ｍｌ（ソフトバッグ）	250ｍＬ			
		点滴注射：１日１回				
		インラインフィルターを使用				
		60　分で				
注射	5	点滴注射		●		
		カルボプラチン	0ｍｇ/A			
		（AUC=6）				
		５％ブドウ糖注　２５０ｍｌ	250ｍＬ			
		点滴注射：１日１回				
		60　分で				
注射	6	点滴注射		●		
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶			
		点滴注射：１日１回				
		フラッシュ用				
		10　分で				
注射	7	点滴注射			●	
		デキサート注　３．３ｍｇ／１ｍｌ	6.6ｍｇ			
		ガスター注　２０ｍｇ	1Ａ			
		ポララミン注　５ｍｇ／１ｍｌ	1Ａ			
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	100ｍＬ			
		点滴注射：１日１回				
		30　分で				
注射	8	点滴注射			●	
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	50ｍＬ			
		30分で(PTX投与前の時間確保用)				
		点滴注射：１日１回				
注射	9	点滴注射			●	
		パクリタキセル注	80ｍｇ/㎡			
		(80mg/㎡)				
		生理食塩液注　２５０ｍｌ（ソフトバッグ）	250ｍＬ			
		点滴注射：１日１回				
		インラインフィルターを使用				
		60　分で				
注射	10	点滴注射			●	
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶			
		点滴注射：１日１回				
		フラッシュ用				
		10　分で				
注射	11	点滴注射				●
		デキサート注　３．３ｍｇ／１ｍｌ	6.6ｍｇ			
		ガスター注　２０ｍｇ	1Ａ			
		ポララミン注　５ｍｇ／１ｍｌ	1Ａ			
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	100ｍＬ			
		点滴注射：１日１回				
		30分で				
注射	12	点滴注射				●
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	50ｍＬ			
		30分で(PTX投与前の時間確保用)				
		点滴注射：１日１回				
注射	13	点滴注射				●
		パクリタキセル注	80ｍｇ/㎡			
		(80mg/㎡)				
		生理食塩液注　２５０ｍｌ（ソフトバッグ）	250ｍＬ			
		点滴注射：１日１回				
		インラインフィルターを使用				
		６０分で				
注射	14	点滴注射				●
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶			
		点滴注射：１日１回				
		フラッシュ用				
		10　分で				