

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパロック)	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		(不要の場合は削除)				
注射	2	点滴注射		●		
		デキサート注 3. 3mg / 1ml	6.6mg			
		ポララミン注 5mg / 1ml	1A			
		ガスター注 20mg	1A			
		アロカリス注 235mg / 10mL	1瓶			
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	3	点滴注射		●		
		パクリタキセル注	70mg / m ²			
		(70mg/m ²)				
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL			
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルターを使用				
		60 分で				
注射	4	点滴注射		●		
		カルボプラチン	0mg / A			
		(AUC=6)				
		5%ブドウ糖注 250m l	250mL			
		点滴注射：1日1回				
		60 分で				
注射	5	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50m l	50mL			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				
		10分で				
注射	6	点滴注射			●	●
		デキサート注 3. 3mg / 1ml	6.6mg			
		ガスター注 20mg	1A			
		ポララミン注 5mg / 1ml	1A			
		生食注 (生理食塩液) 100m l (P G)	100mL			
		点滴注射：1日1回				
		30 分で				
注射	7	点滴注射			●	●
		パクリタキセル注	70mg / m ²			
		(70mg/m ²)				
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL			
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルターを使用				
		60 分で				
注射	8	点滴注射			●	●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				
		10分で				