

レジメン名称：N23-301 Nivo/PEM/CDDPtriweekly(術前)(非扁平上皮癌) 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパリン)	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		(不要の場合は削除)		
注射	2	点滴側管注		●
		生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		ライン確保用およびフラッシュ用(オブジーボ)		
注射	3	点滴側管注		●
		オブジーボ注	360mg	
		(360mg/Body)		
		生食注 (生理食塩液) 50m L (ソフトバッグ)	50m L	
		点滴注射：1日1回		
		単独投与30分 (インラインフィルター使用)		
注射	4	点滴注射		●
		ソルデム3A注 500m l	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		オブジーボ投与終了後に開始		
		90 分で		
注射	5	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500m L	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		90 分で		
注射	6	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500m L	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		60 分で		
注射	7	点滴側管注		●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	9.9mg	
		アロカリス注 235mg / 10m L	1瓶	
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	8	点滴側管注		●
		ヘパリン注	500mg / m ²	
		(500mg/m ²)		
		生食注 (生理食塩液) 50m L (ソフトバッグ)	50m L	
		点滴注射：1日1回		
		10 分で		
注射	9	点滴側管注		●
		マンニトールS注 300m L /袋	300m L	
		点滴注射：1日1回		
		30 分で		
注射	10	点滴側管注		●
		シスプラチン注	75mg / m ²	
		(75mg/m ²)		
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム1本終了後		
		60 分で		
注射	11	点滴側管注		●
		生理食塩液PL 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		フラッシュ用		