

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射 2	点滴側管注 デキサート注 3.3mg/1mL アロカリス注 235mg/10mL アロキシン注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で	9.9mg 1瓶 1袋	●
注射 3	点滴側管注 トラスツズマブBS注 （初回のみ8mg/kg） 注射用水 20mL （トラスツズマブ溶解用） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 初回：90分	8mg/kg 2A 250mL	●
注射 4	点滴側管注 マンニトールS注 300mL/袋 点滴注射：1日1回 30分で	300mL	●
注射 5	点滴側管注 シスプラチン注 （60mg/m <sup>2</sup> ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で	60mg/m <sup>2</sup> 250mL	●
注射 6	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 2時間で	500mL	●
注射 7	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 2時間で	500mL	●
注射 8	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60分で	500mL	●
注射 9	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 （フラッシュ用）	1瓶	●
内服	S-1	80mg/m <sup>2</sup> 分2 食後	day(1)~(14)服用