

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合削除)		
注射 2	点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（オプジーボ）		
注射 3	点滴注射		●
	オプジーボ注 (240mg/body)	240mg	
	生食注（生理食塩液）50mL（ソフトバッグ）	50mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 30分で		
注射 4	点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	3.3mg	
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
	アロキシン注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 5	点滴注射（リザーバーより）		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 アロカリスフラッシュ用		
注射 6	点滴注射（リザーバーより）		●
	レボホリナート注 (200mg/m ²)	200mg/m ²	
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回 120分で		
注射 7	点滴注射(リザーバーより)		●
	エルプラット注 (85mg/m ²)	85mg/m ²	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で		
注射 8	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注 (400mg/m ²)	400mg/m ²	
	生理食塩液PL 50mL	50mL	
	点滴注射：1日1回 4分で		
注射 9	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用。		
注射 10	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注 (2400mg/m ²)	2400mg/m ²	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG） （全量140mLに調製）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 type_T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で		