

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (パミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
注射	2 点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	3.3mg	
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3 点滴注射		●
	アバスチン注 (7.5mg/kg)	7.5mg/kg	
	生食注（生理食塩液） 50mL (ソフトバッグ)	50mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	4 点滴注射		●
	カンプト注 (200mg/m ²)	200mg/m ²	
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回 90分で		
注射	5 点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
内服			
	カペシタビン	1600mg/m ² 分2 食後	day(1)~(14)服用