

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
	パリンNa ⁺ ロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（パミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2 点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg	
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3 点滴注射（リザーバーより）		●
	カンプト注 （165mg/m ² ）	165mg/m ²	
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射	4 点滴注射（リザーバーより）		●
	レボホリナート注 （200mg/m ² ）	200mg/m ²	
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回 エルプラットと同時に投与 120分で		
注射	5 点滴注射（リザーバーより）		●
	エルプラット注 （85mg/m ² ）	85mg/m ²	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で		
注射	6 点滴注射（リザーバーより）		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	7 点滴注射（リザーバーより）		●
	5-FU注 （3200mg/m ² ）	3200mg/m ²	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG） （全量140mLに調製）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 type_T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で		