

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●
注射 2	点滴側管注 デキサート注 3.3mg/1mL アロカリス注 235mg/10mL アロキン注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で	9.9mg 1瓶 1袋	●
注射 3	点滴側管注 トラスツズマブBS注 (6mg/kg) 注射用水 20mL (トラスツズマブ溶解用) 生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 2回目以降30分可。	6mg/kg 2A 250mL	●
注射 4	点滴側管注 マンニトールS注 300mL/袋 点滴注射：1日1回 30分で	300mL	●
注射 5	点滴側管注 シスプラチン注 (60mg/m ²) 生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で	60mg/m ² 250mL	●
注射 6	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 2時間で	500mL	●
注射 7	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60分で	500mL	●
注射 8	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60分で	500mL	●
注射 9	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
内服	S-1	80mg/m ² 分2 食後	day(1)~(14)服用