

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	デキサート注 3.3 mg / 1 mL	3.3mg	
	ポララミン注 5 mg / 1 mL	1A	
	アロカリス注 235 mg / 10 mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3	点滴注射		●
	サイラムザ注 (8mg/kg)	8mg/kg	
	生理食塩液注 250 mL (ソフトバッグ) (全量250mLに調製)	250mL	
	点滴注射：1日1回 (インラインフィルターを使用) 初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。		
注射 4	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50 mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 5	点滴注射		●
	カンプト注 (150mg/m ²)	150mg/m ²	
	生理食塩液注 250 mL (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回 90分で		
注射 6	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50 mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		