

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミン)	1筒	
	ワンショット：1日1回		
	リザーバーフラッシュ用		
	(不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	3.3mg	
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回		
	30分で		
注射 3	点滴注射（リザーバーより）		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回		
	アロカリスフラッシュ用		
注射 4	点滴注射（リザーバーより）		●
	レボホリナート注	200mg/m <sup>2</sup>	
	(200mg/m <sup>2</sup> )		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回		
	120分で		
注射 5	点滴注射(リザーバーより)		●
	エルプラット注	85mg/m <sup>2</sup>	
	(85mg/m <sup>2</sup> )		
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回		
	レボホリナートと同時に側管から投与		
	120分で		
注射 6	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	
	(400mg/m <sup>2</sup> )		
	生理食塩液PL 50mL	50mL	
	点滴注射：1日1回		
	4分で		
注射 7	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回		
	フラッシュ用		
注射 8	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	
	(2400mg/m <sup>2</sup> )		
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶	
	(全量140mLに調製)		
	点滴注射：1日1回		
	type_T (青色タイプで持ち帰り)		
	46時間で		