

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘパミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射 2	点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	9.9mg	
	アロカリス注 235mg / 10m L	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3	点滴注射（リザーバーより）		●
	アバスチン注 (5mg/kg)	5mg / kg	
	生食注（生理食塩液） 50m L（ソフトバッグ）	50m L	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 4	点滴注射（リザーバーより）		●
	カンプト注 (165mg/m ²)	165mg / m ²	
	生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250m L	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 5	点滴注射		●
	レボホリナート注 (200mg/m ²)	200mg / m ²	
	生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250m L	
	点滴注射：1日1回 エルプラットと同時に投与 120分で		
注射 6	点滴注射（リザーバーより）		●
	エルプラット注 (85mg/m ²)	85mg / m ²	
	5%ブドウ糖注 250m l	250m L	
	点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で		
注射 7	点滴注射（リザーバーより）		●
	生理食塩液 PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用。		
注射 8	点滴注射（リザーバーより）		●
	5-FU注 (3200mg/m ²)	3200mg / m ²	
	生食注（生理食塩液） 100m l（PG） （全量140m lに調製）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 type T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で		