

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合削除)	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 (リザーバーより) デキサート注 3.3mg / 1ml アロカリス注 235mg / 10mL アロキン注バッグ 0.75mg / 50mL 点滴注射：1日1回 30分で	3.3mg 1瓶 1袋	●
注射 3	点滴注射(リザーバーより) トラスツズマブBS注 (4mg/kg) 注射用水 20mL (トラスツズマブ溶解用) 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 2回目以降 30分可	4mg/kg 1A 250mL	●
注射 4	点滴注射 (リザーバーより) レボホリナート注 (200mg/m ²) 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 120分で	200mg/m ² 250mL	●
注射 5	点滴注射(リザーバーより) エルプラット注 (85mg/m ²) 5%ブドウ糖注 250m l 点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で	85mg/m ² 250mL	●
注射 6	点滴注射(リザーバーより) 5-FU注 (400mg/m ²) 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回 4分で	400mg/m ² 50mL	●
注射 7	点滴注射 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用。	1瓶	●
注射 8	点滴注射(リザーバーより) 5-FU注 (2400mg/m ²) 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) (全量140m l に調製) 点滴注射：1日1回 type_T (青色タイプで持ち帰り) 46時間で	2400mg/m ² 1瓶	●