

| 分類 No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) |
|--------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 注射 1 | 静脈内注射 | | ● |
| | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 | 1筒 | |
| | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミン) | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | | |
| 注射 2 | 点滴側管注 | | ● |
| | 生理食塩液 P L 50m l | 1瓶 | |
| | 点滴注射：1日1回 (プライミング用) | | |
| 注射 3 | 点滴側管注 | | ● |
| | デキサート注 3.3mg / 1m l | 9.9mg | |
| | アロカリス注 235mg / 10m l | 1瓶 | |
| | アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m l | 1袋 | |
| | 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で | | |
| 注射 4 | 点滴側管注 | | ● |
| | マンニトールS注 300m l / 袋 | 300m l | |
| | 点滴注射：1日1回 30分で | | |
| 注射 5 | 点滴側管注 | | ● |
| | シスプラチン注 (40-80mg/m ²) | 60mg / m ² | |
| | 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) | 250m l | |
| | 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で | | |
| 注射 6 | 点滴側管注 | | ● |
| | 生理食塩液 P L 50m l | 1瓶 | |
| | 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 | | |
| 注射 7 | 点滴注射 | | ● |
| | ソルデム3A注 500m l | 500m l | |
| | 点滴注射：1日1回 90分で | | |
| 注射 8 | 点滴注射 | | ● |
| | ヴィーン3G注 500m l | 500m l | |
| | 点滴注射：1日1回 60分で | | |
| 注射 9 | 点滴注射 | | ● |
| | ヴィーン3G注 500m l | 500m l | |
| | 点滴注射：1日1回 60分で | | |
| 内服 | | | |
| | S-1 | 80mg/m ² 分2 食後 | day(1)~(21)服用 |