

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパミロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴注射		●		
	デキサート注 3.3mg / 1ml	3.3mg			
	アロカリス注 235mg / 10mL	1瓶			
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 3	点滴注射		●		
	生理食塩液PL 50m l	1瓶			
	点滴注射：1日1回 アロカリスフラッシュ用				
注射 4	点滴注射		●		
	ジェムザール注 (1000mg/m <sup>2</sup> )	1000mg / m <sup>2</sup>			
	5%ブドウ糖注 100m l	100m L			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 5	点滴注射		●		
	カルボプラチン (AUC=5)	0mg / A			
	5%ブドウ糖注 250m l	250m L			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射 6	点滴注射		●		
	生理食塩液PL 50m l	1瓶			
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10分で				
注射 7	点滴注射			●	●
	デキサート注 3.3mg / 1ml	6.6mg			
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 8	点滴注射			●	●
	ジェムザール注 (1000mg/m <sup>2</sup> )	1000mg / m <sup>2</sup>			
	5%ブドウ糖注 100m l	100m L			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 9	点滴注射			●	●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶			
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10分で				