

| 分類 No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) |
|--------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 注射 | 1 静脈内注射 | | ● |
| | 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 | 1筒 | |
| | パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パリンロック) | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | | |
| 注射 | 2 点滴注射 | | ● |
| | 生食注(生理食塩液) 100m l (PG) | 1瓶 | |
| | 点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用(オプジーボ) | | |
| 注射 | 3 点滴注射 | | ● |
| | オプジーボ注 (360mg/B) | 360mg | |
| | 生食注(生理食塩液) 50m L (ソフトバッグ) | 50m L | |
| | 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 30分で | | |
| 注射 | 4 点滴注射 | | ● |
| | デキサート注 3.3mg/1m l | 3.3mg | |
| | アロカリス注 235mg/10m L | 1瓶 | |
| | アロキシ注バッグ 0.75mg/50m L | 1袋 | |
| | 点滴注射：1日1回 30分で | | |
| 注射 | 5 点滴注射 | | ● |
| | エルプラット注 (130mg/m ²) | 130mg/m ² | |
| | 5%ブドウ糖注 250m l | 250m L | |
| | 点滴注射：1日1回 120分で | | |
| 注射 | 6 点滴注射 | | ● |
| | 生理食塩液 PL 50m l | 1瓶 | |
| | 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 | | |
| 内服 | | | |
| | S-1 | 80mg/m ² 分2 食後 | day(1)~(14)服用 |