

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘパロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回		
	リザーバーフラッシュ用 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	9.9mg	
	ブスコパン注 20mg / 1m l	1A	
	アロカリス注 235mg / 10m L	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3	点滴注射(リザーバーより)		●
	エルプラット注 (85mg/m ²)	85mg / m ²	
	5%ブドウ糖注 250m l	250m L	
	点滴注射：1日1回 120分で		
注射 4	点滴注射（リザーバーより）		●
	レボホリナート注 (200mg/m ²)	200mg / m ²	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 カンプトと同時に投与 120分で		
注射 5	点滴注射(リザーバーより)		●
	カンプト注 (150mg/m ²)	150mg / m ²	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 90分で		
注射 6	点滴注射（リザーバーより）		●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 7	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注 (2400mg/m ²)	2400mg / m ²	
	生食注(生理食塩液) 100m l (PG) (全量140m lに調製)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 type_T (青色タイプで持ち帰り) 46時間で		