

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用		
注射	2 点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100 mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ルート確保及びフラッシュ用（キトルダ）		
注射	3 点滴注射		●
	キトルダ注 （200mg/body）	200mg	
	生食注（生理食塩液）100 mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で		
注射	4 点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	3.3mg	
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	5 点滴側管注		●
	カルボプラチン （AUC=5）	0mg/A	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	7 点滴注射		●
	5-FU注 （4000mg/m ² ）	4000mg/m ²	
	生食注（生理食塩液）100 mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 LV2で全量185mLに調製。 96時間で		