

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘパミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用		
注射 2	点滴注射		●
	デキサート注 3.3 mg / 1 mL	3.3mg	
	アロカリス注 235 mg / 10 mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射 3	点滴側管注		●
	カルボプラチン （AUC=5）	0mg / A	
	5%ブドウ糖注 250 mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 60 分で		
注射 4	点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 5	点滴注射		●
	5-FU注 （4000mg/m <sup>2</sup> ）	4000mg / m <sup>2</sup>	
	生食注（生理食塩液）100 mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 LV2で全量185mLに調製。 96時間で		