

分類 No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1 静脈内注射		●
生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パリンロック)	1筒	
ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2 点滴注射		●
デキサート注 3.3mg / 1ml	3.3mg	
アロカリス注 235mg / 10mL	1瓶	
アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3 点滴注射		●
トラスツズマブBS注 (初回のみ8mg/kg)	8mg/kg	
注射用水 20mL (トラスツズマブ溶解用)	2A	
生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL	
点滴注射：1日1回 初回90分		
注射 4 点滴注射		●
エルプラット注 (130mg/m ²)	130mg/m ²	
5%ブドウ糖注 250m l	250mL	
点滴注射：1日1回 120分で		
注射 5 点滴注射		●
生理食塩液PL 50m l	1瓶	
点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
内服		
カペシタビン	2000mg/m ² 分2 食後	day(1)~(14)服用