

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射 (リザーバーより)		●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒		
		ペリNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ペリロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回			
		リザーバーフラッシュ用 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射 (リザーバーより)		●	
		デキサート注 3.3mg/1m l	6.6mg		
		ポララミン注 5mg/1m l	1A		
		アロカリス注 235mg/10m L	1瓶		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50m L	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴注射(リザーバーより)		●	
		アービタックス注 (250mg/m <sup>2</sup> )	250mg/m <sup>2</sup>		
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で			
注射	4	点滴注射 (リザーバーより)		●	
		生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶		
		点滴注射：1日1回 15分で			
注射	5	点滴注射 (リザーバーより)		●	
		レボホリナート注 (200mg/m <sup>2</sup> )	200mg/m <sup>2</sup>		
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L		
		点滴注射：1日1回 120分で			
注射	6	点滴注射(リザーバーより)		●	
		カンプト注 (150-180mg/m <sup>2</sup> )	150mg/m <sup>2</sup>		
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L		
		点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 90分で			
注射	7	点滴注射(リザーバーより)		●	
		5-FU注 (400mg/m <sup>2</sup> )	400mg/m <sup>2</sup>		
		生理食塩液PL 50m l	50m L		
		点滴注射：1日1回 レボホリナート終了後全開 4分で			
注射	8	点滴注射		●	
		生理食塩液PL 50m l	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	9	点滴注射(リザーバーより)		●	
		5-FU注 (2400mg/m <sup>2</sup> )	2400mg/m <sup>2</sup>		
		生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) (全量140m lに調製)	1瓶		
		点滴注射：1日1回 type_T (青色タイプで持ち帰り) 46時間で			
注射	10	点滴注射 (リザーバーより)			●
		デキサート注 3.3mg/1m l	6.6mg		
		ポララミン注 5mg/1m l	1A		
		生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	11	点滴注射(リザーバーより)			●
		アービタックス注 (250mg/m <sup>2</sup> )	250mg/m <sup>2</sup>		
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で			
注射	12	点滴注射 (リザーバーより)			●
		生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶		
		点滴注射：1日1回 15分で			