

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●		
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ヘパリンNa液用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用				
注射 2	点滴注射		●		
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	ポララミン注 5mg/1mL	1A			
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶			
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 3	点滴側管注		●		
	アービタックス注 (2回目以降250mg/m ²)	250mg/m ²			
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射 4	点滴注射		●		
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶			
	点滴注射：1日1回 15分で				
注射 5	点滴側管注		●		
	カルボプラチン (AUC=5)	0mg/A			
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射 6	点滴注射		●		
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 (フラッシュ用)				
注射 7	点滴注射		●		
	5-FU注 (4000mg/m ²)	4000mg/m ²			
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶			
	点滴注射：1日1回 LV2で全量185mLに調製。 96時間で				
注射 8	静脈内注射 (リザーバーより)			●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ヘパリンNa液用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 9	点滴注射			●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	ポララミン注 5mg/1mL	1A			
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 10	点滴側管注			●	●
	アービタックス注 (2回目以降250mg/m ²)	250mg/m ²			
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射 11	点滴注射			●	●
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶			
	点滴注射：1日1回 15分で				