

| 分類 No. | 薬剤/手技                                    | 投与量                   | day(1) |
|--------|--|-----------------------|--------|
| 注射 1   | 静脈内注射（リザーバーより）                           |                       | ●      |
|        | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付                  | 1筒                    |        |
|        | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)      | 1筒                    |        |
|        | ワンショット：1日1回                              |                       |        |
|        | リザーバーフラッシュ用<br>(不要の場合は削除)                |                       |        |
| 注射 2   | 点滴注射（リザーバーより）                            |                       | ●      |
|        | デキサート注 3.3mg / 1m l                      | 3.3mg                 |        |
|        | アロカリス注 235mg / 10m L                     | 1瓶                    |        |
|        | アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L                  | 1袋                    |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>30分で                        |                       |        |
| 注射 3   | 点滴注射                                     |                       | ●      |
|        | ベクティピックス注<br>(6mg/kg)                    | 6mg/kg                |        |
|        | 生食注（生理食塩液）100m l（PG）                     | 100m L                |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>インラインフィルターを使用<br>60分で       |                       |        |
| 注射 4   | 点滴注射（リザーバーより）                            |                       | ●      |
|        | 生食注（生理食塩液）100m l（PG）                     | 100m L                |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>15分で                        |                       |        |
| 注射 5   | 点滴注射（リザーバーより）                            |                       | ●      |
|        | レボホリナート注<br>(200mg/m <sup>2</sup> )      | 200mg/m <sup>2</sup>  |        |
|        | 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）                    | 250m L                |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>120分で                       |                       |        |
| 注射 6   | 点滴注射(リザーバーより)                            |                       | ●      |
|        | エルプラット注<br>(85mg/m <sup>2</sup> )        | 85mg/m <sup>2</sup>   |        |
|        | 5%ブドウ糖注 250m l                           | 250m L                |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>レボホリナートと同時に側管から投与<br>120分で  |                       |        |
| 注射 7   | 点滴注射(リザーバーより)                            |                       | ●      |
|        | 5-FU注<br>(400mg/m <sup>2</sup> )         | 400mg/m <sup>2</sup>  |        |
|        | 生理食塩液PL 50m l                            | 50m L                 |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>4分で                         |                       |        |
| 注射 8   | 点滴注射（リザーバーより）                            |                       | ●      |
|        | 生理食塩液PL 50m l                            | 1瓶                    |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用                      |                       |        |
| 注射 9   | 点滴注射(リザーバーより)                            |                       | ●      |
|        | 5-FU注<br>(2400mg/m <sup>2</sup> )        | 2400mg/m <sup>2</sup> |        |
|        | 生食注（生理食塩液）100m l（PG）<br>(全量140m lに調製)    | 1瓶                    |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>type_T（青色タイプで持ち帰り）<br>46時間で |                       |        |